

Lievä keuhkokuume (CRB-65 = 0), 64/74 potilasta sai tarpeettoman laajakirjoista antibiootihoidoa. Asianmukaiseksi katsottu hoito: amoksisilliini.

I.v. kefalosporiini 27
Makrolidi + i.v. kefalosporiini 11
Hengitystiekinoloni + i.v. kefalosporiini 9
Makrolidi + amoksisilliini 6
Doksisykliini + amoksisilliini 5
Hengitystiekinoloni 2
Hengitystiekinoloni + amoksisilliini 1
Piperasilliini-tazobaktaami 1
Kefuroksiimi + metronidatsoli 1
Amoksisilliini + klavulaamihappo 1

Keskivaikea keuhkokuume (CRB-65 = 1–2), 59/304 potilasta sai tarpeettoman laajakirjoista antibiootihoidoa. Asianmukaiseksi katsottu hoito: i.v. kefuroksiimi tai G-penisilliini.

I.v. kefalosporiini + hengitystiekinoloni 34
Piperasilliini + tazobaktaami 9
I.v. kefalosporiini, laajakirjoisempi kuin kefuroksiimi 5
i.v. kefalosporiini + hengitystiekinoloni + makrolidi 2
Hengitystiekinoloni + penisilliini 2
Piperasilliini + tazobaktaami + i.v. kefalosporiini 2
i.v. kefalosporiini + hengitystiekinoloni + amoksisilliini 1
i.v. kefalosporiini + hengitystiekinoloni + penisilliini 1
I.v. kefalosporiini + tobramysiini 1
I.v. kefalosporiini + daptomysiini 1
Piperasilliini + tazobaktaami + hengitystiekinoloni 1

Vaikea keuhkokuume (CRB-65 = 3–4) 7/92 potilasta sai tarpeettoman laajakirjoista antibiootihoidoa. Asianmukaiseksi katsottu hoito: Kefuroksiimi tai keftriaksoni yhdessä moksifloksasiinin tai levofloksasiinin kanssa tai makrolidiin yhdistettynä.

Piperasilliini + tazobaktaami 2
Piperasilliini + tazobaktaami + hengitystiekinoloni 2
Piperasilliini + tazobaktaami + metronidatsoli 1
Piperasilliini + tazobaktaami + i.v. kefalosporiini 1
Piperasilliini + tazobaktaami + hengitystiekinoloni + i.v. kefalosporiini 1

i.v.: suonensisäinen annostelu, muut lääkkeet annettu suun kautta.