

Liitetaulukko 1. 7 vuoden kuolleisuus alaryhmissä

Coxin regressioanalyysi

Malli 1: ikävakiointi + vyötärönympäryys+ alkoholinkäyttö + psyykkinen terveys, päivittäistoiminnot (kolmiportainen)

Malli 2: ikävakiointi + vyötärönympäryys+ alkoholinkäyttö + psyykkinen terveys

Alaryhmä	Ilman moni- sairastavuutta, esigerasteniaa tai gerasteniaa	Esigerastenia ilman monisairasta- vuutta	Gerastenia ilman monisairasta- vuutta	Monisairasta- vuus ilman esigerasteniaa tai gerasteniaa	Monisairasta- vuus ja esigerastenia	Monisairasta- vuus ja gerastenia
Vain yli 82-vuotiaat, n = 258	n = 48 16 kuolemaa	n = 85 47 kuolemaa	n = 20 16 kuolemaa	n = 29 10 kuolemaa	n = 61 38 kuolemaa	n = 15 15 kuolemaa
Ikä, keskiarvo (SE)	85,6 (0,3)	85,8 (0,3)	86,8 (0,5) ¹	84,7 (0,4) ¹	85,7 (0,3)	86,6 (0,6)
	Riskisuhde (95 %:n luottamusväli) 7 vuoden kuolleisuudelle					
Malli 1	1,0 (referenssi)	2,68 (1,36–5,29)	4,60 (1,91–11,1)	1,61 (0,68–3,85)	2,87 (1,43–5,75)	7,59 (3,19–18,1)
Ei päivittäistoimintojen tai liikunnallista toiminnanvajetta ², n = 355	n = 105 22 kuolemaa	n = 130 53 kuolemaa	n = 9 5 kuolemaa	n = 44 16 kuolemaa	n = 62 33 kuolemaa	n = 5 3 kuolemaa
	Riskisuhde (95 %:n luottamusväli) 7 vuoden kuolleisuudelle					
Malli 2	1,0 (referenssi)	1,98 (1,16–3,37)	2,74 (1,00–7,48)	1,74 (0,88–3,46)	2,87 (1,61–5,12)	3,31 (0,76–14,3)

¹ Vain nämä eroavat merkitsevästi toisistaan kovarianssianalyysissä.

² Toiminnanvajete: paljon rajoituksia kylpemisessä tai pukemisessa tai paljon rajoituksia puolen kilometrin kävelyssä.