

Liite 2. Potilaan kardiovaskulaaririskiryhmän määrytyminen

Luokittelusta jätettiin pois 26 potilasta, joiden riskiluokkaa ei voi määritellä puuttuvien vastauksien takia

Erittäin suuri riski, 365/1 041 vastaajaa -> 35,1 % vastaajista

Todettu kardiovaskulaari- tai munuaissairaus:

Kysymykseen 9 ”kyllä”-vastaus johonkin seuraavista: munuaissairaus, jalkojen verenkierron häiriö, aivoverenkierron häiriö, sydänlihassairaus, sydämen vajaatoiminta, sepelvaltimotauti

JA/TAI: Kaikki, jotka ovat kysymyksen 10 vastausten mukaisesti olleet sairaalahoidossa

Suuri riski, 430/1 041 vastaajaa -> 41,3 % vastaajista

T2D kesto 10 vuotta tai enemmän (kysymys 6) JA vähintään yksi seuraavista riskitekijöistä (n = 288):

Ikä yli 70 vuotta (kysymys 2)

Kohonnut verenpaine (kysymys 9)

Rasva-aineenvaihdunnan häiriö (kysymys 9)

Tupakointistatus ”kyllä” (kysymys 5)

BMI 30 kg/m² tai yli (kysymys 3+4)

TAI: Vähintään kolme näistä riskitekijöistä samanaikaisesti: ikä, verenpaine, dyslipidemia, tupakointi, lihavuus (n = 279)

Kohtalainen riski, 246/1 041 vastaajaa -> 23,6 % vastaajista

Kaikki muut vastaajat, joilta riskiluokka voitiin määritellä