

Liitetaulukko 3. Diabeteslääkkeiden käyttö potilaan kardiovaskulaaririskin mukaan

Diabeteksen kesto	Erittäin suuri riski (n = 365)		Suuri riski (n = 430)		Kohtalainen riski (n = 246)	
	n	%	n	%	n	%
alle 2 v	27	7,4	40	9,3	67	27,2
3–9 v	130	35,6	101	23,5	172	69,9
yli 10 v	207	56,7	288	67,0	7	2,8
Lääkkeiden lukumäärä ¹	N	%	N	%	N	%
1 lääke	115	31,5	148	34,4	117	47,6
2 lääkettä	121	33,2	132	30,7	87	35,4
3 lääkettä	88	24,1	108	25,1	32	13,0
4 + lääkettä	41	11,2	42	9,8	10	4,1
Metformiini	266	72,9	337	78,4	193	78,5
GLP-1 ja/tai SGLT2i	172	47,1	189	44,0	100	40,7
SGLT2:n estäjä	135	37,0	152	35,3	88	35,8
DPP4:n estäjä	101	27,7	113	26,3	49	19,9
GLP1-RA	79	21,6	73	17,0	25	10,2
Oraalinen yhdistelmävalmiste ¹	43	11,8	66	15,3	27	11,0
GLP1-RA JA SGLT2i päällekkäin	42	11,5	36	8,4	13	5,3
Yksi tai useampi insuliinivalmiste ²	108	29,6	84	19,5	17	6,9

¹ Oraalinen yhdistelmävalmiste laskettiin kahdeksi lääkkeeksi

² Insuliinin lisäksi potilaalla tuli olla vähintään yksi muu diabeteslääke