

## Liite 1. Webropol-kyselyn kysymykset

1. Koulutus
  - a. geriatrian erikoislääkäri
  - b. geriatriaan erikoistuva lääkäri
  - c. neurologian erikoislääkäri
  - d. neurologiaan erikoistuva lääkäri
  - e. muu, mikä:
  
2. Mahdollinen toinen erikoisala
  - a. yleislääketiede
  - b. geriatria
  - c. neurologia
  - d. sisätaudit
  - e. ei muuta erikoislääkäritutkintoa
  - f. muu, mikä:
  
3. Ikä
  - a. 25–30 vuotta
  - b. 30–35 vuotta
  - c. 35–40 vuotta
  - d. 40–45 vuotta
  - e. 45–50 vuotta
  - f. 50–55 vuotta
  - g. 55–60 vuotta
  - h. 60–65 vuotta
  - i. > 65 vuotta
  
4. Onko sinulla muistisairauksien hoidon erityispätevyys?
  - a. kyllä
  - b. ei
  
5. Päätoiminen työpaikka
  - a. julkinen sektori, sairaala
  - b. julkinen sektori, terveyskeskus
  - c. yksityinen sektori
  - d. yliopisto
  - e. muu, mikä:
  
6. Päätoiminen työnkuva (voit valita tarvittaessa useamman vaihtoehdon)
  - a. muistipoliklinikka
  - b. muu geriatrian poliklinikka
  - c. muu neurologian poliklinikka
  - d. muu vastaanottotoiminta
  - e. vuodeosasto
  - f. kotihoito

- g. tehostettu palveluasuminen / ympärivuorokautinen hoiva
  - h. muu, mikä:
7. Miten usein keskimäärin aloitat muistilääkkeen potilaallesi (AKE-lääke tai memantiini)?
- a. 2 kertaa tai useammin/ viikko
  - b. n. kerran viikossa
  - c. n. kerran kahdessa viikossa
  - d. n. kerran kuukaudessa tai harvemmin
  - e. en koskaan tai muutaman kerran vuodessa
8. Mitä muistiläkettä määrääät ensisijaisesti potilaillesi? Voit valita 1–2 vaihtoehtoa.
- a. donepetsiili
  - b. galantamiini
  - c. rivastigmiini, tablettimuoto
  - d. rivastigmiini, laastarimuoto
  - e. memantiini
9. Minkä ikäisiä potilaita arvioisit keskimäärin hoitavasi (tässä tarkoitetaan potilaita, joille diagnosoit muistisairauden ja aloitat lääkityksen)? Jos hoitamasi potilaiden ikäjakauma on kovin laaja, voit valita 2–3 vaihtoehtoa.
- a. alle 65-vuotiaita
  - b. 65–70-vuotiaita
  - c. 70–75 –vuotiaita
  - d. 75–80-vuotiaita
  - e. 80–85-vuotiaita
  - f. yli 85-vuotiaita
10. Miten suurella osalla potilaistasi arvioisit olevan muistilääkkeen määräämiseen vaikuttavia liitännäissairauksia tai -lääkityksiä (esimerkiksi sepelvaltimotauti, munuaisten vajaatoiminta, ortostatismi, sydämen johtumishäiriö, virtsainkontinenssi, anemia, antikolinerginen lääkitys, sykettä hidastava lääkitys).
- a. < 10 %
  - b. 10–50 %
  - c. 50–90 %
  - d. lähes kaikilla (>90 %)
11. Mikä on keskimäärin potilaidesi toimintakyky muistiläkettä aloitettaessa? Toimintakyky voi olla rajoittunut myös muusta syystä kuin muistisairaudesta.
- a. kotona asuva, pärjää itsenäisesti
  - b. kotona asuva, pärjää puolison tai muun läheisen pienellä tuella
  - c. kotona asuva, kotihoidon käynnit kerran päivässä tai harvemmin
  - d. kotona asuva, kotihoidon käynnit useammin kuin kerran päivässä tai omaishoito
  - e. tehostettu palveluasuminen / ympärivuorokautinen hoiva

12. Mitä tutkimuksia pyydät potilaasta ennen muistilääkkeen aloitusta? Voit valita useamman. Diagnostisia tutkimuksia kuten pään kuvantamista ei tarvitse mainita.
- "muistilaboratoriokokeet", sis PVK:n
  - EKG:n
  - muu, mikä:
13. Mitä EKG-muutoksia pidät vasta-aiheena AKE-lääkkeen aloittamiselle? Voit valita useamman vaihtoehdon.
- sinusbradykardia, syke  $< 50/\text{min}$
  - sinusbradykardia, syke  $< 60/\text{min}$
  - I-asteen AV-katkos
  - II-asteen AV-katkos
  - pidentynyt QTc-aika
  - eteisvärinä, kammiovaste  $>60/\text{min}$
  - eteisvärinä, kammiovaste  $50\text{--}60/\text{min}$
  - eteisvärinä, kammiovaste  $< 50/\text{min}$
  - riippuu tilanteesta, mm. muusta lääkityksestä
  - en osaa sanoa
  - jokin muu, mikä:
14. Pyydätkö potilaasta kontrolli-EKG:n AKE-lääkkeen aloituksen jälkeen?
- kyllä
  - ei
  - joskus
15. Jos pyydät kontrolli-EKG:n, missä vaiheessa pyydät sen? Voit valita tarvittaessa useamman vaihtoehdon.
- n. 1 kk lääkealoituksesta, ennen annosnostoa
  - n. 2 kk lääkealoituksesta, ennen annosnostoa
  - annosnoston jälkeen
  - kontrollikäynnin yhteydessä, ajankohta lääkealoituksesta:
  - jokin muu, mikä:
16. Mitä EKG-muutosta (verrattuna ennen lääkitystä otettuun filmiin) pidät vasta-aiheena annosnostolle? Voit valita useamman vaihtoehdon.
- sinusbradykardia, syke  $< 50/\text{min}$
  - sinusbradykardia, syke  $< 60/\text{min}$
  - I-asteen AV-katkos
  - II-asteen AV-katkos
  - pidentynyt QTc-aika
  - eteisvärinä, kammiovaste  $>60/\text{min}$
  - eteisvärinä, kammiovaste  $50\text{--}60/\text{min}$
  - eteisvärinä, kammiovaste  $< 50/\text{min}$
  - riippuu tilanteesta, mm. muusta lääkityksestä
  - en osaa sanoa
  - jokin muu, mikä:

17. Koetko EKG-muutosten vaikeuttavan muistisairauksien lääkehoitoa

- a. en lainkaan
- b. vähän
- c. jonkin verran
- d. paljon

18. Mitä hemoglobiiniarvoa pidät vasta-aiheena muistilääkkeen (AKE-lääkitys) aloitukselle?

- a.  $< 100$
- b. viiterajan alle, mutta  $> 100$
- c. muu, mikä:

potilaan hemoglobiini ei vaikuta AKE-lääkkeen aloitukseen