

**Liitetaulukko 1.** Muistisairaiden potilaiden taustatietoja muistisairauslääkettä aloitettaessa

Muistisairauksia hoitaville lääkäreille (vastausten n = 157) esitetty kysymys	n (%)
<b>Hoidettavien potilaiden ikäjakauma<sup>1</sup></b>	
< 65 vuotta	4 (3 %)
65–70 vuotta	17 (11 %)
70–75 vuotta	38 (24 %)
75–80 vuotta	105 (67 %)
80–85 vuotta	124 (79 %)
> 85 vuotta	67 (43 %)
<b>Kuinka suurella osalla potilaista muistilääkkeen aloitukseen vaikuttavia oheissairauksia tai lääkityksiä<sup>2</sup></b>	
< 10 %	1 (1 %)
10–50 %	33 (21 %)
50–90 %	83 (53 %)
> 90 %	40 (25 %)
<b>Potilaiden toimintakyky<sup>3</sup></b>	
Asuu kotona, pärjää itsenäisesti	9 (6 %)
Asuu kotona, pärjää läheisen pienellä tuella	79 (50 %)
Asuu kotona, kotihoito ≤ 1 krt/vrk	29 (19 %)
Asuu kotona, kotihoito ≥ 1 krt/vrk tai omaishoito	32 (20 %)
Tehostettu palveluasuminen tai ympärivuorokautinen hoiva	8 (5 %)

<sup>1</sup> Mahdollisuutena valita useampi vaihtoehto.

<sup>2</sup> Esim. sepelvaltimotauti, ortostatismi, sydämen johtumishäiriö tai anemia; esim. antikolinerginen tai sykettä hidastava lääkitys.

<sup>3</sup> Voi olla rajoittunut myös muusta syystä kuin muistisairaudesta.