

Liitetaulukko 2. Ensisijaisen muistisairauslääkkeen valinnan ja kontrolli-EKG:n pyytämisen käytännöt

Muistisairauksia hoitaville lääkäreille esitetty kysymys	n (%)
Ensisijaiset muistisairauslääkkeet (1–2 vaihtoehtoa) (vastanneiden n = 156)	
Donepetsiili tai memantiini	38 (24 %)
Donepetsiili tai rivastigmiini, laastarimuoto	33 (21 %)
Pelkkä donepetsiili	24 (15 %)
Memantiini tai rivastigmiini, laastarimuoto	11 (7 %)
Muut ¹	50 (32 %)
Kontrolli-EKG (vastanneiden n = 157)	
Kyllä	86 (55 %)
Joskus	63 (40 %)
Ei	8 (5 %)
Kontrolli-EKG:n ajankohta ² (vastanneiden n = 145)	
Noin 1 kk lääkealoituksesta, ennen annosnostoa	109 (75 %)
Noin 2 kk lääkealoituksesta, ennen annosnostoa	11 (8 %)
Annosnoston jälkeen	45 (31 %)
Kontrollikäynnillä, 3–12 kk lääkealoituksesta ³	16 (11 %)
Muu ⁴	20 (14 %)

¹ Muut mahdolliset 1-2 lääkkeen valinnat (kunkin n < 10) listasta: donepetsiili, galantamiini, tablettimuotoinen rivastigmiini, laastarimuotoinen rivastigmiini, memantiini.

² Mahdollisuutena valita useampi vaihtoehto.

³ Koottu avoimista vastauksista.

⁴ Mm. 1–3 viikkoa lääkealoituksesta, syketasojen perusteella.