

Verkkoliite 1.

PEWS (Pediatric Early Warning Score) -kortit

		< 3 kk	4	2	1	0	1	2	4	Kortti on muokattu Sairaanhoidajailton PEWS-kortin pohjalta.
A B	Hengitystaajuus (HT)	< 15	15–19	20–29	30–60	61–80	81–90	> 91		
	Hengitystyö	Hyvin vaikea / apnea	Vaikeutunut		Normaali					
	Happisaturointi (SpO ₂)	< 85	85–90	91–94	> 94					
	Lisähappi käytössä				Ei		< 50 % tai < 4 l/min	> 50 % tai ≥ 4 l/min		
C	Systolinen verenpaine	< 45	45–49	50–59	60–80	81–100	101–130	> 130		
	Syketaajuus	< 80	80–89	90–109	110–150	151–180	181–190	> 190		
	Kapillaaritäyttö				< 3 s			≥ 3 s		
D	Tajunnan taso	Poikkeava			Normaali					

		3–12 kk	4	2	1	0	1	2	4	PEWS
A B	Hengitystaajuus (HT)	< 15	15–19	20–24	25–50	51–70	71–80	> 80		
	Hengitystyö	Hyvin vaikea / apnea	Vaikeutunut		Normaali					
	Happisaturointi (SpO ₂)	< 85	85–90	91–94	> 94					
	Lisähappi käytössä				Ei		< 50 % tai < 4 l/min	> 50 % tai ≥ 4 l/min		
C	Systolinen verenpaine	< 60	60–69	70–79	80–99	100–120	121–150	> 150		
	Syketaajuus	< 70	70–79	80–99	100–150	151–170	171–180	> 180		
	Kapillaaritäyttö				< 3 s			≥ 3 s		
D	Tajunnan taso	Poikkeava			Normaali					

		1–<5 vuotta	4	2	1	0	1	2	4	Lasten aikaisen varoituksen pistejärjestelmä
A B	Hengitystaajuus (HT)	< 12	12–14	15–19	20–40	41–60	61–70	> 70		
	Hengitystyö	Hyvin vaikea / apnea	Vaikeutunut		Normaali					
	Happisaturointi (SpO ₂)	< 85	85–90	91–94	> 94					
	Lisähappi käytössä				Ei		< 50 % tai < 4 l/min	> 50 % tai ≥ 4 l/min		
C	Systolinen verenpaine	< 65	65–74	75–89	90–110	111–125	126–160	> 160		
	Syketaajuus	< 60	60–69	70–89	90–120	121–150	151–170	> 170		
	Kapillaaritäyttö				< 3 s			≥ 3 s		
D	Tajunnan taso	Poikkeava			Normaali					

5–12 vuotta		4	2	1	0	1	2	4
A B	Hengitystaajuus (HT)	< 10	10–11	12–19	20–30	31–40	41–50	> 50
	Hengitystyö	Hyvin vaikea / apnea	Vaikeutunut		Normaali			
	Happisaturointi (SpO ₂)	< 85	85–90	91–94	> 94			
	Lisähappi käytössä				Ei		< 50 % tai < 4 l/min	> 50 % tai ≥ 4 l/min
C	Systolinen verenpaine	< 70	70–79	80–89	90–120	121–140	141–170	> 170
	Syke-taajuus	< 50	50–59	60–69	70–110	111–130	131–150	> 150
	Kapillaaritäyttö				< 3 s			≥ 3 s
D	Tajunnan taso	Poikkeava			Normaali			

Kortti on muokattu Sairaanhoidajailiiton PEWS-kortin pohjalta.

> 12 vuotta		4	2	1	0	1	2	4
A B	Hengitystaajuus (HT)	< 9	9	10–11	12–16	17–22	23–30	> 30
	Hengitystyö	Hyvin vaikea / apnea	Vaikeutunut		Normaali			
	Happisaturointi (SpO ₂)	< 85	85–90	91–94	> 94			
	Lisähappi käytössä				Ei		< 50 % tai < 4 l/min	> 50 % tai ≥ 4 l/min
C	Systolinen verenpaine	< 75	75–84	85–99	100–130	131–150	151–190	> 190
	Syketaajuus	< 40	40–49	50–59	60–100	101–120	121–140	> 140
	Kapillaaritäyttö				< 3 s			≥ 3 s
D	Tajunnan taso	Poikkeava			Normaali			

PEWS

Pisteytys	≥ 8	4–7 tai yksittäisestä arvosta 4	1–3	0
Riskiluokka	Korkea	Kohtalainen	Matala	Matala
Toimintaohje	Aloita välittömät hoitotoimenpiteet. Konsultoi välittömästi lääkäriä. Tee MET-hälytys. Lääkärin arvio tehohoidon tarpeesta.	Aloita tarvittaessa välittömät hoitotoimenpiteet. Konsultoi lääkäriä hoitopaikasta ja -toimista. Tee tarvittaessa MET-hälytys.	Informoi osaston muita hoitajia potilaan voinnin muutoksesta. Ota tarvittaessa yhteys lääkäriin.	Potilaan hoito ja seuranta normaalin hoitokäytännön mukaisesti.
Peruselin-toimintojen seuranta	Laske PEWS-pisteet 0–30 min välein. Jatkuva seuranta.	Laske PEWS-pisteet vähintään 1 h välein.	Laske PEWS-pisteet vähintään 4–6 h välein.	Laske PEWS-pisteet vähintään 8 h välein.

Lasten aikaisen varoituksen pistejärjestelmä