

Liitetaulukko 1.

Kuolleisuus 100 000:ta henkilöä kohden Suomessa vuosina 2000–2022 eri syihin Tilastokeskuksen aikasarjaluokituksen mukaan. Trendin p-arvo on laskettu molemmat sukupuolet yhdistettynä.

Kuolemansyy	Sukupuoli	N	Kuolleisuus	Ikävakioitu kuolleisuus	95 %:n luottamusvälin alaraja	95 %:n luottamusvälin yläraja	Trendin p-arvo	Sukupuolten välisen eron muutoksen p-arvo
00–54 Yhteensä	Miehet	593 092	974,50	1 079,66	1 076,84	1 082,49	< 0,0001	< 0,0001
	Naiset	596 675	946,99	680,33	678,58	682,08		
00–41 Taudit ja tapaturmainen alkoholimyrkytys (A00-R99, U071, U072, U109, X45)	Miehet	537 030	882,39	984,61	981,90	987,32	< 0,0001	< 0,0001
	Naiset	568 955	903,00	644,60	642,91	646,30		
00 Covid-19-virusinfektio (U071, U072, U109)	Miehet	3 099	5,09	6,26	6,04	6,49	< 0,0001	0,77224
	Naiset	2 760	4,38	3,00	2,89	3,12		
01–03 Tartunta- ja loistauteja (A00-B99, J65)	Miehet	3 585	5,89	6,62	6,40	6,84	< 0,0001	0,28092

Kuolemansyy	Sukupuoli	N	Kuolleisuus	Ikävakioitu kuolleisuus	95 %:n luottamusvälin alaraja	95 %:n luottamusvälin yläraja	Trendin p-arvo	Sukupuolten välisen eron muutoksen p-arvo
	Naiset	3 980	6,32	4,67	4,52	4,82		
01 Tuberkuloosi (A15–A19, B90, J65)	Miehet	603	0,99	1,16	1,07	1,26	< 0,0001	0,06466
	Naiset	627	1,00	0,72	0,67	0,78		
02 Immuunikato (HIV-tauti) (B20–B24)	Miehet	105	0,17	0,17	0,14	0,21	0,00961	0,36527
	Naiset	28	0,04	0,05	0,03	0,07		
03 Muut tartunta- ja loistaudit (A00–A09, A20–B19, B25–B89, B91–B99)	Miehet	2 877	4,73	5,29	5,09	5,49	< 0,0001	0,13469
	Naiset	3 325	5,28	3,90	3,76	4,03		
04-22 Kasvaimet (C00–D48)	Miehet	143 999	236,60	248,11	246,80	249,43	< 0,0001	< 0,0001
	Naiset	129 868	206,12	158,36	157,49	159,23		

Kuolemansyy	Sukupuoli	N	Kuolleisuus	Ikävakioitu kuolleisuus	95 %:n luottamusvälin alaraja	95 %:n luottamusvälin yläraja	Trendin p-arvo	Sukupuolten välisen eron muutoksen p-arvo
04-21 Syövät (C00–C97)	Miehet	140 814	231,37	241,98	240,68	243,28	< 0,0001	< 0,0001
	Naiset	125 666	199,45	153,56	152,70	154,42		
04 Huulen, suuontelon ja nielun syöpä (C00–C14)	Miehet	2 694	4,43	4,24	4,08	4,41	0,02736	0,94293
	Naiset	1 538	2,44	1,87	1,77	1,96		
05 Ruokatorven syöpä (C15)	Miehet	4 017	6,60	6,35	6,15	6,55	< 0,0001	0,00083
	Naiset	1 793	2,85	2,14	2,04	2,24		
06 Mahasyöpä (C16)	Miehet	6 176	10,15	10,49	10,23	10,77	< 0,0001	0,56157
	Naiset	4 772	7,57	5,82	5,66	5,99		
07 Koolonin syöpä (C18, C19)	Miehet	8 704	14,30	15,22	14,89	15,55	0,00045	0,26934
	Naiset	9 290	14,74	11,06	10,83	11,28		

Kuolemansyy	Sukupuoli	N	Kuolleisuus	Ikävakioitu kuolleisuus	95 %:n luottamusvälin alaraja	95 %:n luottamusvälin yläraja	Trendin p-arvo	Sukupuolten välisen eron muutoksen p-arvo
08 Peräsuolen ja peräaukon syöpä (C20–C21)	Miehet	5 121	8,41	8,69	8,45	8,94	< 0,0001	0,23719
	Naiset	3 800	6,03	4,58	4,43	4,73		
09 Primaarinen maksasyöpä (C22)	Miehet	6 502	10,68	10,87	10,60	11,14	0,28728	< 0,0001
	Naiset	4 130	6,55	4,95	4,80	5,10		
10 Haimasyöpä (C25)	Miehet	11 328	18,61	18,65	18,30	19,01	< 0,0001	0,69894
	Naiset	12 252	19,45	14,73	14,47	14,99		
11 Kurkunpään, henkitorven ja keuhkon syöpä (C32–C34)	Miehet	34 030	55,91	56,06	55,45	56,67	< 0,0001	< 0,0001
	Naiset	15 569	24,71	19,06	18,76	19,37		
12 Ihon melanooma (C43)	Miehet	2 834	4,66	4,75	4,57	4,93	0,0167	0,02767

Kuolemansyy	Sukupuoli	N	Kuolleisuus	Ikävakioitu kuolleisuus	95 %:n luottamusvälin alaraja	95 %:n luottamusvälin yläraja	Trendin p-arvo	Sukupuolten välisen eron muutoksen p-arvo
	Naiset	1 721	2,73	2,14	2,04	2,25		
13 Rintasyöpä (C50)	Miehet	93	0,15	0,15	0,12	0,19	< 0,0001	0,10666
	Naiset	19 566	31,05	24,96	24,60	25,31		
14 Kohdunkaulan syöpä (C53)	Naiset	1 276	2,03	1,69	1,60	1,79	< 0,0001	
15 Kohtusyöpä (C54–C55)	Naiset	4 233	6,72	5,09	4,93	5,24	0,74875	
16 Munasarjasyöpä (C56)	Naiset	7 228	11,47	9,01	8,80	9,22	< 0,0001	
17 Eturauhasen syöpä (C61)	Miehet	19 433	31,93	37,24	36,71	37,78	< 0,0001	
18 Munuaissyöpä (C64)	Miehet	4 476	7,35	7,51	7,28	7,74	< 0,0001	0,99362
	Naiset	3 444	5,47	4,11	3,97	4,25		
19 Virtsarakkosalisyöpä (C67)	Miehet	4 258	7,00	8,00	7,76	8,25	< 0,0001	0,41413

Kuolemansyy	Sukupuoli	N	Kuolleisuus	Ikävakioitu kuolleisuus	95 %:n luottamusvälin alaraja	95 %:n luottamusvälin yläraja	Trendin p-arvo	Sukupuolten välisen eron muutoksen p-arvo
	Naiset	1 733	2,75	1,99	1,90	2,09		
20 Imu- ja vertamuodostavien kudosten syöpä (C81–C96)	Miehet	13 206	21,70	23,22	22,82	23,63	< 0,0001	0,38601
	Naiset	12 143	19,27	14,61	14,35	14,88		
21 Muut syövät	Miehet	17 942	29,48	30,53	30,08	31,00	< 0,0001	0,75836
	Naiset	21 178	33,61	25,77	25,42	26,12		
22 Muut kasvaimet (D00–D48)	Miehet	3 185	5,23	6,13	5,92	6,36	0,00032	0,87189
	Naiset	4 202	6,67	4,80	4,65	4,95		
23–24 Umpieritys-, ravitsemus- ja aineenvaihduntasairaudet (E00–E90)	Miehet	8 198	13,47	14,28	13,97	14,60	< 0,0001	< 0,0001
	Naiset	7 670	12,17	9,31	9,10	9,53		

Kuolemansyy	Sukupuoli	N	Kuolleisuus	Ikävakioitu kuolleisuus	95 %:n luottamusvälin alaraja	95 %:n luottamusvälin yläraja	Trendin p-arvo	Sukupuolten välisen eron muutoksen p-arvo
23 Diabetes (E10–E14)	Miehet	6 545	10,75	11,39	11,11	11,67	< 0,0001	< 0,0001
	Naiset	5 860	9,30	6,98	6,80	7,17		
24 Muut umpieritys- ravitseminen- ja aineenvaihduntasairaudet (E00– E09, E15–E90)	Miehet	1 653	2,72	2,90	2,76	3,04	< 0,0001	0,39236
	Naiset	1 810	2,87	2,33	2,22	2,44		
25 Dementia, Alzheimerin tauti (F01, F03, G30, R54)	Miehet	50 388	82,79	110,96	109,98	111,94	< 0,0001	< 0,0001
	Naiset	109 335	173,53	114,48	113,80	115,17		
26 Muut hermoston ja aistimien taudit pl. alkoholiperäiset	Miehet	16 438	27,01	29,70	29,24	30,17	< 0,0001	0,29419
	Naiset	15 987	25,37	19,27	18,97	19,58		

Kuolemansyy	Sukupuoli	N	Kuolleisuus	Ikävakioitu kuolleisuus	95 %:n luottamusvälin alaraja	95 %:n luottamusvälin yläraja	Trendin p-arvo	Sukupuolten välisen eron muutoksen p-arvo
27–30 Verenkiertoelinten sairaudet pl. alkoholiperäiset (I00–I425, I427–I99)	Miehet	220 673	362,58	412,23	410,47	414,01	< 0,0001	< 0,0001
	Naiset	234 729	372,54	257,46	256,41	258,51		
27 Iskeemiset sydäntaudit (I20–I25)	Miehet	132 726	218,08	246,75	245,39	248,12	< 0,0001	< 0,0001
	Naiset	117 318	186,20	127,73	126,99	128,47		
28 Muut, paitsi reumaattiset ja alkoholiset sydäntaudit (I30–I425, I427–I52)	Miehet	19 953	32,78	36,26	35,74	36,78	< 0,0001	< 0,0001
	Naiset	21 433	34,02	23,81	23,48	24,13		
29 Aivoverisuonien sairaudet (I60–I69)	Miehet	41 263	67,80	78,67	77,89	79,45	< 0,0001	0,04549
	Naiset	59 572	94,55	66,25	65,71	66,79		

Kuolemansyy	Sukupuoli	N	Kuolleisuus	Ikävakioitu kuolleisuus	95 %:n luottamusvälin alaraja	95 %:n luottamusvälin yläraja	Trendin p-arvo	Sukupuolten välisen eron muutoksen p-arvo
30 Muut verenkiertoelinten taudit (I00–I15, I26–I28, I70–I99)	Miehet	26 731	43,92	50,56	49,94	51,19	< 0,0001	< 0,0001
	Naiset	36 406	57,78	39,68	39,27	40,09		
31–35 Hengityselinten sairaudet (J00–J64, J66–J99)	Miehet	32 398	53,23	61,24	60,56	61,93	< 0,0001	< 0,0001
	Naiset	22 841	36,25	26,03	25,69	26,37		
31 Influenssa (J09–J11)	Miehet	832	1,37	1,65	1,54	1,77	< 0,0001	0,07346
	Naiset	1 136	1,80	1,26	1,18	1,33		
32 Keuhkokuume (J12–J18, J849)	Miehet	8 012	13,16	16,10	15,74	16,46	< 0,0001	0,03629
	Naiset	9 017	14,31	9,87	9,66	10,08		

Kuolemansyy	Sukupuoli	N	Kuolleisuus	Ikävakioitu kuolleisuus	95 %:n luottamusvälin alaraja	95 %:n luottamusvälin yläraja	Trendin p-arvo	Sukupuolten välisen eron muutoksen p-arvo
33 Keuhkoputkentulehdus ja keuhkolaajentuma (J40–J44, J47)	Miehet	18 296	30,06	33,65	33,15	34,15	< 0,0001	< 0,0001
	Naiset	8 127	12,90	9,64	9,43	9,85		
34 Astma (J45–J46)	Miehet	589	0,97	1,19	1,09	1,29	< 0,0001	0,0824
	Naiset	1 429	2,27	1,63	1,54	1,71		
35 Muut hengityselinten sairaudet (J00–J06, J20–J39, J60–J64, J66–J848, J85–J99)	Miehet	4 669	7,67	8,67	8,42	8,93	< 0,0001	0,042
	Naiset	3 132	4,97	3,64	3,51	3,77		
36 Ruuansulatuselinten sairaudet pl. alkoholiperäiset	Miehet	13 038	21,42	23,67	23,26	24,09	< 0,0001	0,39252
	Naiset	16 701	26,51	18,99	18,70	19,28		

Kuolemansyy	Sukupuoli	N	Kuolleisuus	Ikävakioitu kuolleisuus	95 %:n luottamusvälin alaraja	95 %:n luottamusvälin yläraja	Trendin p-arvo	Sukupuolten välisen eron muutoksen p-arvo
37 Virtsa- ja sukupuolielinten sairaudet (N00–N99)	Miehet	3 251	5,34	6,63	6,40	6,87	< 0,0001	< 0,0001
	Naiset	4 857	7,71	5,33	5,18	5,48		
38 Synnynnäiset epämuodostumat ja kromosomipoikkeavuudet (Q00–Q99)	Miehet	2 035	3,34	3,33	3,18	3,48	0,1845	0,17128
	Naiset	2 029	3,22	3,14	3,01	3,28		
39 Muut sairaudet pl. alkoholiperäiset	Miehet	5 484	9,01	9,60	9,34	9,86	< 0,0001	0,00017
	Naiset	7 756	12,31	9,85	9,63	10,08		
40 Tuntemattomat ja epätäydellisesti määritetyt kuolemansyyt (R96–R99)	Miehet	2 393	3,93	3,73	3,58	3,89	< 0,0001	0,43148
	Naiset	1 286	2,04	1,80	1,71	1,91		

Kuolemansyy	Sukupuoli	N	Kuolleisuus	Ikävakioitu kuolleisuus	95 %:n luottamusvälin alaraja	95 %:n luottamusvälin yläraja	Trendin p-arvo	Sukupuolten välisen eron muutoksen p-arvo
41 Alkoholiperäiset taudit ja tapaturmainen alkoholimyrkytys	Miehet	32 051	52,66	48,24	47,71	48,78	< 0,0001	< 0,0001
	Naiset	9 156	14,53	12,90	12,64	13,17		
42–53 Tapaturmat ja väkivalta pl. tapaturmainen alkoholimyrkytys (V01–X44, X46–Y89, U129)	Miehet	53 725	88,27	91,06	90,28	91,85	< 0,0001	< 0,0001
	Naiset	25 959	41,20	33,62	33,21	34,05		
42–49 Tapaturmat pl. tapaturmainen alkoholimyrkytys (V01–X44, X46–X59, Y10–Y15, Y85–Y86)	Miehet	34 750	57,10	60,12	59,47	60,77	< 0,0001	< 0,0001
	Naiset	19 597	31,10	23,70	23,36	24,04		
42 Maaliikennetapaturmat	Miehet	4 462	7,33	7,35	7,14	7,57	< 0,0001	0,03485
	Naiset	1 757	2,79	2,59	2,47	2,71		

Kuolemansyy	Sukupuoli	N	Kuolleisuus	Ikävakioitu kuolleisuus	95 %:n luottamusvälin alaraja	95 %:n luottamusvälin yläraja	Trendin p-arvo	Sukupuolten välisen eron muutoksen p-arvo
43 Muut maakuljetustapaturmat	Miehet	805	1,32	1,33	1,24	1,43	< 0,0001	0,44489
	Naiset	157	0,25	0,23	0,20	0,27		
44 Vesikuljetustapaturmat (V90–V94)	Miehet	1 057	1,74	1,64	1,54	1,74	< 0,0001	0,59505
	Naiset	51	0,08	0,07	0,06	0,10		
45 Muut ja määrittämättömät kuljetustapaturmat (V95–V99)	Miehet	88	0,14	0,14	0,11	0,17	0,00086	0,35476
	Naiset	15	0,02	0,03	0,02	0,04		
46 Tapaturmaiset kaatumiset ja putoamiset (W00–W19)	Miehet	14 478	23,79	27,27	26,82	27,73	< 0,0001	< 0,0001
	Naiset	12 382	19,65	13,58	13,34	13,82		
47 Hukkumistapaturmat (W65–W74)	Miehet	2 311	3,80	3,69	3,54	3,84	< 0,0001	0,19239

Kuolemansyy	Sukupuoli	N	Kuolleisuus	Ikävakioitu kuolleisuus	95 %:n luottamusvälin alaraja	95 %:n luottamusvälin yläraja	Trendin p-arvo	Sukupuolten välisen eron muutoksen p-arvo
	Naiset	530	0,84	0,74	0,68	0,80		
48 Myrkytystapaturmat pl. tapaturmainen alkoholimyrkytys (X40–X44, X46–X49, Y10–Y15)	Miehet	4 477	7,36	7,33	7,12	7,55	< 0,0001	0,72636
	Naiset	1 782	2,83	2,71	2,58	2,84		
49 Muut tapaturmat ja tapaturmien myöhäisvaikutukset	Miehet	7 072	11,62	11,36	11,10	11,64	< 0,0001	0,00018
	Naiset	2 923	4,64	3,76	3,62	3,90		
50 Itsemurhat (X60–X84, Y870)	Miehet	16 023	26,33	26,13	25,72	26,54	< 0,0001	0,07736
	Naiset	5 215	8,28	8,15	7,93	8,37		
51 Murha, tappo tai muu tahallinen pahoinpitely (X85–Y09, Y871)	Miehet	1 509	2,48	2,46	2,34	2,59	< 0,0001	0,76516

Kuolemansyy	Sukupuoli	N	Kuolleisuus	Ikävakioitu kuolleisuus	95 %:n luottamusvälin alaraja	95 %:n luottamusvälin yläraja	Trendin p-arvo	Sukupuolten välisen eron muutoksen p-arvo
	Naiset	665	1,06	1,08	1,00	1,16		
52 Vahingoittavat tapahtumat, tahallisuus epäselvä (Y16–Y34, Y872)	Miehet	1 354	2,22	2,19	2,07	2,31	< 0,0001	0,36494
	Naiset	402	0,64	0,60	0,54	0,66		
53 Muut ulkoiset syyt ja niiden myöhäisvaikutukset (Y35–Y84, Y88–Y89, U129)	Miehet	89	0,15	0,17	0,14	0,21	0,05206	< 0,0001
	Naiset	80	0,13	0,10	0,08	0,13		
54 Ei kuolintodistusta	Miehet	2 337	3,84	3,99	3,82	4,16	< 0,0001	< 0,0001
	Naiset	1 761	2,79	2,10	2,00	2,20		