

Liitetaulukko 1.

Toiminnan muutosta ohjaavat tekijät (DIBQ-mp) ennen koulutusta ja koulutuksen jälkeen sekä eri koulutusryhmien ja ammattiryhmien välillä

TDF-osa-alue	DIBQ-mp-kysymys	Ennen koulutusta	Koulutuksen jälkeen	P-arvo (95 %:n LV)	Etä	Lähi	P-arvo (95 %:n LV)	Lääkärit	Fysioterapia-	P-arvo (95 %:n LV)
TIEDOT										
Tiedot	Tiedän, miten käden ja kyynärvarren rasisairauksien Käypä Hoito -suosituksen mukainen hoito toteutetaan	4,8	6,6	< 0,001	6,4	6,7	0,131 (-0,512–0,068)	6,5	6,6	0,690 (-0,236–0,354)
Tehtävien selkeys	Käden ja kyynärvarren rasisairauksien hoidon tavoitteet ja osuuteni niissä on selkeästi määritelty minulle	4,9	6,6	< 0,001	6,5	6,6	0,373 (-0,479–0,182)	6,5	6,6	0,725 (-0,276–0,393)
TAIDOT										
Taidot	Minut on koulutettu toteuttamaan käden ja kyynärvarren rasisairauksien hoitoa suosituksen mukaisesti	4,4	6,6	< 0,001	6,4	6,8	0,006 (-0,753 – -0,136)	6,5	6,7	0,230 (-0,131–0,529)
	Minulla on taidot toteuttaa käden ja kyynärvarren rasisairauksien hoitoa suosituksen mukaisesti	5,0	6,5	< 0,001	6,4	6,6	0,289 (-0,532–0,162)	6,4	6,5	0,471 (-0,220–0,470)
OMIA KYKYJÄ KOSKEVAT KÄSITYKSET										
Minäpystyvyys	Olen varma, että osaan toteuttaa käden ja kyynärvarren rasisairauksien hoitoa suosituksen mukaisesti	4,4	6,3	< 0,001	6,1	6,5	0,037 (-0,789 – -0,025)	6,2	6,4	0,390 (-0,223–0,562)
Koettu toteutuksen osaaminen	Minulle käden ja kyynärvarren rasisairauksien hoidon toteuttaminen suosituksen mukaisesti on: (Erittäin vaikeaa - Erittäin helppoa)	4,6	5,8	< 0,001	5,7	6,0	0,191 (-0,74–0,152)	5,7	5,9	0,218 (-0,173–0,740)
KÄSITYKSET TOIMINNAN VAIKUTUKSISTA										
Asenne	Mielestäni suosituksen mukainen käden ja kyynärvarren rasisairauksien hoito on: (Erittäin hyödytöntä - Erittäin hyödyllistä)	5,8	6,4	< 0,001	6,4	6,4	1,000 (-0,350–0,350)	6,3	6,6	0,085 (-0,047–0,686)
Tulosodotukset	Jos toteutan käden ja kyynärvarren rasisairauksien hoitoa suosituksen mukaisesti, se vahvistaa yhteistyötä käden ja kyynärvarren rasisairauksien hoitoa toteuttavien ammattilaisten kanssa	5,8	6,6	< 0,001	6,4	6,8	0,046 (-0,733 – -0,007)	6,6	6,7	0,551 (-0,264–0,488)
AIKOMUKSET										
Aikomukset	Kuinka vahva on aikomuksesi toteuttaa käden ja kyynärvarren rasisairauksien hoitoa suosituksen mukaisesti seuraavan 3 kuukauden kuluessa: (Erittäin vähäinen - Erittäin vahva)	6,0	6,8	< 0,001	6,7	6,9	0,152	6,8	6,7	0,764 (-0,312–0,230)
UUSI TOIMINTAMALLI										
Uuden toimintamallin ominaisuudet	Suosituksen mukainen käden ja kyynärvarren rasisairauksien hoito on mahdollista räätälöidä asiakkaiden tarpeiden mukaisesti	5,4	6,6	< 0,001	6,5	6,6	0,436 (-0,527–0,231)	6,3	6,8	0,014 (0,114–0,913)

	Suosituksen mukainen käden ja kyynärvarren rasisutussairauksien hoito sopii päivittäiseen asiakastyöhön	5,7	6,6	< 0,001	6,7	6,6	0,829 (-0,306–0,380)	6,6	6,7	0,396 (-0,194–0,483)
TYÖPAIKKA										
Työpaikan resurssit ja tuki	Työpaikallani on kaikki tarvittavat resurssit käytettävissä käden ja kyynärvarren rasisutussairauksien hoidon toteuttamiseen suosituksen mukaisesti	4,9	6,1	< 0,001	6,0	6,2	0,652 (-0,804–0,508)	5,8	6,4	0,104 (-0,124–1,269)
	Voin luottaa työpaikkani johdon tukeen, kun käden ja kyynärvarren rasisutussairauksien hoidon toteuttamisessa suosituksen mukaisesti ilmaantuu ongelmia	5,2	5,9	< 0,001	5,7	6,0	0,426 (-1,037–0,445)	6,1	5,6	0,185 (-1,210–0,239)
POTILAS/ASIAKAS										
Asiakkaan käsitykset	Potilaat/asiakkaat kokevat suosituksen mukaisen käden ja kyynärvarren rasisutussairauksien hoidon merkityksellisenä	4,4	5,5	< 0,001	5,5	5,6	0,905 (-0,659–0,585)	5,3	5,7	0,219 (-0,252–1,062)
	Potilaat/asiakkaat suhtautuvat myönteisesti suosituksen mukaiseen käden ja kyynärvarren rasisutussairauksien hoitoon	4,8	5,5	< 0,001	5,3	5,7	0,217 (-0,966–0,225)	5,1	5,7	0,051 (-0,003–1,226)
TOIMEENPANOON LIITTYVÄT KÄYTÄNNÖT										
Toimeenpanoon liittyvät käytännöt	Hoitosuositus tarjoaa riittävästi käyttöä tukevaa materiaalia suosituksen mukaisen käden ja kyynärvarren rasisutussairauksien hoidon toteuttamiseen	4,7	6,3	< 0,001	6,5	6,1	0,201 (-0,185–0,851)	6,0	6,5	0,079 (-0,056–1,002)
SOSIAALISEN YMPÄRISTÖN VAIKUTUKSET										
Toiminnan vakiintuneisuus	Ammattilaiset, joiden kanssa toteutan käden ja kyynärvarren rasisutussairauksien hoitoa, toteuttavat sitä suosituksen mukaisesti	4,6	5,3	< 0,001	5,1	5,4	0,440 (-0,928–0,409)	5,7	5,0	0,046 (-1,292 – -0,013)
Sosiaalinen tuki	Voin luottaa, että saan tukea ammattilaisilta, joiden kanssa toteutan käden ja kyynärvarren rasisutussairauksien hoitoa, kun sen toteuttamisessa suosituksen mukaisesti ilmaantuu ongelmia	5,1	5,8	< 0,001	5,7	5,9	0,533 (-0,779–0,408)	6,3	5,5	0,007 (-1,274 – -0,216)
OMAN TOIMINNAN OHJAUS										
Oman toiminnan suunnittelu	Minulla on selkeä suunnitelma, kuinka aion toteuttaa käden ja kyynärvarren rasisutussairauksien hoitoa suosituksen mukaisesti	4,9	6,5	< 0,001	6,4	6,6	0,240	6,4	6,6	0,238 (-0,129–0,508)

TDF = Theoretical domains framework, DIBQ-mp = Toiminnan muutosta ohjaavat tekijät -kysely, LV = luottamusväli.
Vastaukset on annettu 7-portaisella Likert-asteikolla (1 = täysin eri mieltä, 7 = täysin samaa mieltä).